

**Examen d'Aptitude professionnelle pour l'accès au grade  
d'Infirmier Diplômé d'Etat 1<sup>er</sup> Grade (Echelle 10)**

Session du 01 Septembre 2012

Section : Sage-femme

Durée : 3H

Coefficient : 1

épreuve :

Pour répondre aux questions ci-après proposées, cochez la ou les réponses justes :

1) Chez la femme enceinte, le Fer est administré à titre préventif à raison :

De 60mg par semaine pendant 30 semaines	
De 80mg par semaine pendant 30 semaines	
De 100mg par semaine pendant 30 semaines	
De 120 mg par semaine pendant 30 semaines	
De 140mg par semaine pendant 30 semaines	

2) A titre curatif, le Fer peut être administré chez la femme enceinte et allaitante à raison :

De 60mg /j pendant 2 mois	
De 80mg /j pendant 2 mois	
De 120mg /j pendant 2 mois	
De 140 mg /j pendant 2 mois	
De 180mg /j pendant 2 mois	

3) Dans le cadre du PNI, le vaccin anti Rota virus est administré à l'enfant

A la naissance	
A 1 mois	
A 2 mois	
A 3 mois	
A 4 mois	

4) Le vaccin anti Rota virus est administré à l'enfant pour prévenir :

La Rubéole	
La méningite	
Les gripes	
Les Diarrhées	
Les convulsions	

5) Le vaccin contre la poliomyélite peut être conservé

Au congélateur à - 20° C	
Entre 0 et +8 °C	
Entre 0 et +12°C	
Entre +1 et 8 °C	
Entre +2 et 12 °C	

2 sur 6

6) La vitamine A est administrée à l'enfant en supplémentation :

a. A 6 mois	
b. A 9 mois	
c. A 12 mois	
d. A 15 mois	
e. A 18 mois	

7) La vitamine A est administrée en supplémentation chez la mère :

a. Au 3 <sup>ème</sup> mois de grossesse	
b. Au 6 <sup>ème</sup> mois de grossesse	
c. Au 9 <sup>ème</sup> mois de grossesse	
d. Le 1 <sup>er</sup> mois qui suit l'accouchement	
e. Le 2 <sup>ème</sup> mois qui suit l'accouchement	

8) Une mère vous demande comment favoriser l'acquisition de la propreté chez son enfant de 15 mois. Que lui conseillez-vous ?

a. de le mettre sur le pot pendant les repas	
b. de l'inciter à aller sur le pot	
c. de respecter sa maturité physiologique	
d. de le réprimander lorsqu'il n'est pas propre	

9) Le dépistage de la Tuberculose est effectué chez la population cible constituée :

a. Des femmes enceintes	
b. Des consultants pour signes respiratoires	
c. Des sujets contacts	
d. De patients avec image thoracique anormale	
e. De patients avec IDR négative	

10) Après un accouchement normal, le DIU peut être inséré à partir de :

a. 4 Semaines	
b. 6 Semaines	
c. 2 mois	
d. 3 mois	
e. 3 semaines pour les DIUs en cuivre	

11) Que faire pour une utilisatrice d'un DIU en cuivre qui présente une infection pelvienne ?

a. Traiter l'infection	
b. Demander un prélèvement et traiter	
c. Traiter, retirer, et proposer une couverture contraceptive	
d. Retirer le DIU et traiter	



12) Après l'accouchement une femme non allaitante peut commencer la pilule Micro progestative à :

a. 15 jours	
b. 21 jours	
c. 40 jours	
d. 2 mois	

13) Après l'accouchement, une femme allaitante peut commencer la prise de la pilule Micro progestative à :

a. 15 jours	
b. 21 jours	
c. 6 semaines	
d. 2 mois	
e. 3 mois	

14) Que conseillez-vous à une femme en cas d'oubli de prise d'une pilule COC:

a. Prendre la pilule oubliée et continuer normalement	
b. Prendre 2 pilules	
c. Prendre la pilule oubliée et continuer normalement avec une protection supplémentaire pendant 7 jours	
d. Prendre la pilule oubliée et continuer normalement avec une protection supplémentaire pendant 48 heures	

15) Que conseillez-vous à une femme en cas d'oubli de prise d'une pilule PMP ;

a. Prendre la pilule oubliée et continuer normalement	
b. Prendre 2 pilules	
c. Prendre la pilule oubliée et continuer normalement avec une protection supplémentaire pendant 7 jours	
d. Prendre la pilule oubliée et continuer normalement avec une protection supplémentaire pendant 48 heures	

16) Vous recevez une femme pour réapprovisionnement en progestatifs injectables 12 jours après le délai requis. Que faire ?

a. Faire l'injection	
b. Conseiller d'attendre les prochaines règles	
c. Faire l'injection et donner une protection supplémentaire	
d. Proposer une couverture contraceptive (condoms) en attendant les prochaines règles	

17) Chez un sujet vacciné contre le tétanos et ayant eu un rappel 6 ans avant, quelle est la conduite à tenir en cas de plaie simple par un bout de bois?

a. Pas de sérothérapie ni de vaccination	
b. Injection d'un rappel d'anatoxine	
c. Injection d'un rappel d'anatoxine suivie d'une injection de sérum antitétanique	
d. Injection d'un sérum antitétanique	
e. Injection d'un sérum antitétanique à raison d'un par jour pendant 3 jours	

18) La taille de l'enfant double à :

a. 6 mois	
b. 1 an	
c. 2 ans	
d. 3 ans	
e. 5 ans	

19) Le taux d'incidence se définit comme étant :

a. Nombre total de cas dans une période donnée(t) XK	
La population exposée au risque à la même période(t)	
b. La Population total exposée dans une période (t) XK	
Le nombre total des nouveaux cas dans la même période	
c. Nombre total de cas dans une période donnée(t) XK	
La population exposée au risque à la même période(t)	
d. Nombre de nouveaux cas dans une période donnée XK	
Le nombre total de cas enregistrés dans la même période	

20) Un enfant de 24 mois doit avoir la dentition suivante :

a. 4 incisives + 2 prémolaires + 2 molaires	
b. 4 incisives + 4 prémolaires + 2 molaires	
c. 8 incisives + 4 prémolaires + 4 canines	
d. 8 incisives + 2 prémolaires + 4 molaires	

21) Le taux de la mortalité maternelle au Maroc est de 112/100.000 NV

Vrai	
Faux	

22) L'hôpital SEGMA est un service de l'état géré de manière autonome .Il jouit de la personnalité morale

Vrai	
Faux	

23) Le vaccin antipolio utilisé est un vaccin vivant atténué :

Vrai	
Faux	

24) La femme allaitante peut commencer la pilule oestroprogestative quand l'enfant atteint l'âge de 6 mois ;

Vrai	
Faux	